



## PROPECIA® - Finasteride 1 mg Tablette


### Was in diesem Abschnitt ist

Dieser Abschnitt beantwortet einige allgemeine Fragen über PROPECIA. Er enthält nicht alle vorhandenen Informationen. Er findet nicht der Unterhaltung mit Ihrem Doktor oder Apotheker statt. Alle Medizin hat Gefahren und Nutzen. Ihr Doktor hat die Gefahren von Ihnen PROPECIA gegen den Nutzen nehmend gewogen, den sie erwarten, daß es für Sie hat. Wenn Sie irgendwelche Interessen über das Nehmen dieser Medizin haben, fragen Sie Ihren Doktor oder Apotheker.

### Für welches PROPECIA verwendet wird

PROPECIA ist für Gebrauch durch nur Männer. PROPECIA wird verwendet, um Männer mit männlichem Musterhaarverlust zu behandeln, um Haarwachstum auf dem Scalp zu erhöhen und weiteren Haarverlust zu verhindern. Männlicher Musterhaarverlust (alias androgenetic Alopezie) ist ein allgemeiner Zustand, in dem Männer das Verdünnen des Haares auf dem Scalp erfahren. Dieses ergibt häufig eine Zurücktretenhaarlinie und/oder Balding auf die Oberseite des Kopfes. Diese Änderungen beginnen gewöhnlich, in einigen Männern in ihrem 20s einzutreten und mit Alter allgemeiner zu werden. Sobald Haarverlust über einem langen Zeitabschnitt aufgetreten ist, kann das Haar dauerhaft verloren werden. Männlicher Musterhaarverlust wird gedacht, durch eine Kombination der Familiengeschichte (Vererbung) und die Produktion eines bestimmten männlichen Hormons verursacht zu werden, genannt worden dihydrotestosterone (DHT). Männer mit männlichem Musterhaarverlust haben mehr DHT im balding Teil ihres Scalp als in anderen Teilen, und das resultiert in erhöhtem Haarverlust.

### Wie PROPECIA arbeitet



PROPECIA senkt spezifisch die Niveaus von DHT im Scalp und so hilft, den balding Prozeß aufzuheben. PROPECIA beeinflusst nicht Haar auf anderen Körperteilen. Männer mit mildem zum moderieren, aber nicht komplett, Haarverlust können erwarten, vom Gebrauch PROPECIA zu profitieren. In den Frauen, die studiert wurden, war PROPECIA nicht in der Behandlung des Haarverlustes (androgenetic Alopezie) sollte keine Notwendigkeit dort sein, Ihr übliches Haarobachtprogramm zu ändern wirkungsvoll (zum Beispiel, Shampooing oder Haarschnitte) weil Sie PROPECIA nehmen. PROPECIA ist nicht süchtig machend.

### Vor Ihnen nehmen Sie PROPECIA

### Wenn Sie nicht es nehmen dürfen

### Nehmen Sie nicht PROPECIA, wenn:

- Sie haben eine Allergie zu PROPECIA oder zu irgendwelchen der Bestandteile, die am Ende dieses Blättchens verzeichnet werden
- Symptome einer allergischen Reaktion auf PROPECIA können Hautausschlag oder Swelling der Lippen oder des Gesichtes einschließen.
- Das Verpacken wird heftig gezerrissen oder Zeichen des Abgebens zeigt

- Das Verfallsdatum am Satz hat überschritten
- Wenn Sie nehmen, hat diese Medizin nach dem Verfallsdatum, es kann möglicherweise nicht arbeiten überschritten.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie PROPECIA zu nehmen, beginnen sollten, sprechen Sie mit Ihrem Doktor. Frauen, die schwanger sind oder schwangeres Nehmen PROPECIA sein können des Muß nicht, die zerquetschten oder gebrochenen Tabletten oder die Handgrifftabletten mit den nassen Händen anfassen. Wenn die Aktivsubstanz in PROPECIA aufgesogen wird, nachdem man die Tablette oder durch die Haut von einer Frau geschluckt hat, die mit einem männlichen Baby schwanger ist, kann sie das männliche Baby veranlassen, mit Abweichungen der Geschlechtorgane getragen zu werden. Vollständige Tabletten werden beschichtet, um Kontakt mit der Aktivsubstanz während der normalen Behandlung zu verhindern, vorausgesetzt daß die Tabletten nicht zerquetscht worden oder gebrochen worden sind. Wenn eine schwangere Frau PROPECIA schluckte, die zerquetschten oder gebrochenen Tabletten anfaßt oder Tabletten mit den nassen Händen anfaßt, muß ihr Doktor sofort beraten werden. Geben Sie den Kindern oder den Frauen PROPECIA nicht. PROPECIA ist für Gebrauch durch nur Männer.

## Bevor Sie beginnen, es zu nehmen

### Erklären Sie Ihrem Doktor, wenn:

- Sie haben oder haben alle medizinischen Bedingungen gehabt
- Sie haben alle mögliche Allergien zu irgendeiner anderen Medizin oder alle mögliche anderen Substanzen, wie Nahrungsmittel, Konservierungsmittel oder Färbungen.

Wenn Sie nicht Ihrem Doktor über irgendwelche vom oben genannten erklärt haben, erklären Sie ihnen, bevor Sie jedes mögliches PROPECIA nehmen.

### Nehmen anderer Medizin

Erklären Sie Ihrem Doktor, wenn Sie irgendeine andere Medizin nehmen, einschließlich Medizin, die Sie ohne eine Verordnung von Ihrer Apotheke, von Supermarkt oder von Gesundheit Nahrungsmittelgeschäft kaufen. Etwas Medizin kann die Weise beeinflussen andere Medizinarbeit. Jedoch ist PROPECIA nicht gezeigt worden, um andere Medizin zu behindern.

### Wie man PROPECIA nimmt

#### Wie viel zu nehmen



Nehmen Sie PROPECIA, nur wenn Sie durch Ihren Doktor vorgeschrieben werden. Die Dosis ist eine Tablette, die einmal jeden Tag gedauert wird. PROPECIA bearbeitet nicht schnelleres oder verbessert, wenn Sie ihm mehr als einmal täglich dauern. Schwalbe PROPECIA mit einem Glas Wasser. Es macht nicht aus, wenn Sie PROPECIA vor oder nach Nahrung nehmen. Folgen Sie allen Richtungen, die sorgfältig Ihnen von Ihrem Doktor gegeben werden. Sie können von den Informationen sich unterscheiden, die in diesem Blättchen enthalten werden. Wenn Sie nicht die Anweisungen im Kasten verstehen, bitten Sie Ihren Doktor oder Apotheker um Hilfe.

#### Wenn Sie vergessen, sie zu nehmen

Wenn es fast Zeit für Ihre folgende Dosis ist, überspringen Sie die Dosis, die Sie vermißten und nehmen Sie Ihre folgende Dosis, wenn Sie zu bedeutet werden. Wenn es nicht fast Zeit für Ihre folgende Dosis ist, nehmen Sie sie, sobald Sie sich erinnern, und gehen Sie dann zurück zu dem Nehmen Ihrer Tablette, wie Sie normalerweise wurden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob man die Dosis, Gespräch zu Ihrem Doktor oder Apotheker überspringt. Nehmen Sie nicht eine doppelte Dosis, um die Dosis auszugleichen, die Sie vermißten. Wenn Sie Mühe erinnernd, Ihre Tabletten zu nehmen haben, bitten Sie Ihren Apotheker um einige Tips.

#### Wie man lang sie nimmt

Männlicher Musterhaarverlust ist eine Bedingung, die über einem langen Zeitabschnitt sich entwickelt. Weil es Zeit für neues Haar dauert zu wachsen, sehen Sie nicht sofortige Resultate. Im allgemeinen können täglicher Gebrauch für 3 Monate oder mehr vor Ihnen notwendig sein Nachricht erhöhtes Haarwachstum oder Verhinderung des weiteren Verlustes. Fahren Sie fort, PROPECIA für so lang zu nehmen, wie Ihr Doktor vorschreibt.

#### Wenn Sie stoppen, es zu nehmen

Wenn Sie stoppen, die Tabletten zu nehmen, ist Ihr Haarverlust wahrscheinlich wieder aufzunehmen.

#### Wenn Sie zu viel nehmen (Überdosis)

Telephonieren Sie sofort Ihren Doktor oder die Staatsangehörig-Gift-Informationszentrale (Telefon 03 474 7000) für Rat, wenn Sie denken, daß Sie oder jedermann zu viel PROPECIA sonst genommen haben können. Tun Sie dies, selbst wenn es keine Zeichen der Unannehmlichkeit oder der Vergiftung gibt.

## Während Sie PROPECIA verwenden

### Sachen, die Sie tun müssen

Wenn Sie im Begriff sind, auf irgendeiner neuen Medizin begonnen zu werden, erklären Sie Ihrem Doktor und Apotheker, daß Sie PROPECIA nehmen.

### Sachen, die Sie nicht tun dürfen

Geben Sie nicht PROPECIA zu niemandem sonst, selbst wenn sie die gleiche Bedingung wie Sie haben.

### Schädliche Wirkungen

Erklären Sie Ihrem Doktor oder Apotheker so bald wie möglich, wenn Sie nicht Brunnen glauben, während Sie PROPECIA nehmen. PROPECIA hilft den meisten Männern mit männlichem Musterhaarverlust, aber, wie mit aller Medizin, es unerwünschte schädliche Wirkungen haben kann. Alle Medizin kann schädliche Wirkungen haben. Manchmal sind sie, die meisten der Zeit ernst, die sie nicht sind. Sie können ärztliche Behandlung benötigen, wenn Sie einige der schädlichen Wirkungen erhalten. Bitten Sie Ihren Doktor oder Apotheker, alle mögliche Fragen zu beantworten, die Sie haben können. Erklären Sie Ihrem Doktor, wenn Sie irgendwelche vom folgenden beachten und sie Sie sich sorgen.

- Schwierigkeit, wenn eine Aufrichtung erzielt wird
- Weniger Wunsch nach Geschlecht
- Verringerte Menge Samen gab während des Geschlechtes frei (diese Abnahme scheint nicht, normale sexuelle Funktion zu behindern).

Jede dieser schädlichen Wirkungen trat in weniger als zwei Männern in hundert auf. Es ist wichtig, zu verstehen, daß, in den klinischen Versuchen, diese unerwünschten Effekte in den Männern, die stoppten PROPECIA, zu nehmen, sowie in vielen Männern verschwanden, die Behandlung fortsetzten. Auch erklären Sie Ihrem Doktor, wenn Sie Probleme mit Ejakulation beachten und sie Sie sich sorgt. Erklären Sie Ihrem Doktor sofort, wenn Sie irgendwelche vom folgenden beachten:

- Brustswelling und/oder -weichheit
- Hautausschlag, itchiness
- Bienenstöcke oder Verdickung des Nesselhautausschlags (pinkish, juckendes auf der Haut)
- Testikelschmerz.

Diese sind seltene schädliche Wirkungen, die mit PROPECIA berichtet worden sind. Erklären Sie Ihrem Doktor sofort oder gehen Sie zum Unfall und zur Dringlichkeit an Ihrem nächsten Krankenhaus; wenn das folgende geschieht:

- Swelling der Lippen oder des Gesichtes.

Diese können Symptome einer ernstesten allergischen Reaktion zu PROPECIA sein, die Schwierigkeit bei dem Schlucken und der Atmung verursachen. Sie können dringende ärztliche Behandlung benötigen. Ernste schädliche Wirkungen sind selten. Andere schädliche Wirkungen, die nicht oben verzeichnet werden, können in einigen Männern auftreten. Erklären Sie Ihrem Doktor oder Apotheker, wenn Sie irgendwelche anderen unerwünschten Effekte beachten.

## Nachdem PROPECIA verwendet worden ist

### Ablage

Halten Sie Ihre Tabletten im Blase Satz, bis es Zeit ist, sie zu nehmen. Wenn Sie die Tabletten aus dem Blase Satz heraus nehmen, können sie möglicherweise nicht gut halten. Setzen Sie nie die Tabletten in einen anderen Kasten oder in Behälter ein, wie sie oben gemischt erhalten konnten. Halten Sie PROPECIA in einem kühlen trockenen Platz, in dem die Temperatur unter 30°C bleibt. Speichern Sie sie oder keine andere Medizin im Badezimmer oder nähern Sie sich einer Wanne. Lassen Sie sie nicht im Auto oder auf Fenster Sills. Hitze und Feuchtigkeit können etwas Medizin zerstören. Halten Sie es, wo Kinder nicht es erreichen können. Ein verschlossener Schrank mindestens anderthalb Meter über dem Boden ist ein guter Platz, zum von von Medizin zu speichern.

### Beseitigung

Wenn Ihr Doktor Ihnen erklärt zu nehmen zu stoppen, bitten die Tabletten, oder die Tabletten haben ihr Verfallsdatum geführt, Ihren Apotheker um um was, mit irgendwelchen zu tun, die rüber gelassen werden.